



English

INSTRUCTIONS FOR GINGIVAL RETRACTION

1. Prepare the tooth as normal.
2. If excessive bleeding, use a hemostatic/astringent agent.
3. Attach the mixing nozzle and dispensing tip to the 2.5ml GingiTrac Retraction syringe, express a "pea-sized" amount and discard.
This is to ensure that the catalyst and base are being mixed thoroughly.
4. Syringe the GingiTrac Retraction material directly around the tooth preparations' margin using the included dispensing tip.
5. Fill the GingiCap with GingiTrac Retraction material and place back over the preparation.
6. Have patient close with firm but not excessive pressure. Wait 3 to 5 minutes, depending on the amount of bleeding or oozing for complete set and retraction.
7. Remove the set GingiTrac. Check for complete retraction. If needed, repeat steps 5 and 6.
8. If necessary, gently rinse and dry the prepared teeth. You are now ready to take your standard impression.

- Do not use the GingiTrac™ as a final impression.
- Do not handle either material with latex or rubber gloves.

Deutsch

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR GINGIVALE RETRAKTION

1. Präparieren Sie den Zahn wie gewohnt.
2. Verwenden Sie bei übermäßiger Blutung ein Blut stillendes/astringentes Mittel.
3. Bringen Sie die Mischdüse und die Kanüle an der 2,5-ml-GingiTrac-Retraktionsspritze an, drücken Sie eine erbsengroße Menge heraus und werfen Sie diese weg. Dies sorgt dafür, dass der Katalysator und der Grundstoff gut miteinander vermischt sind.
4. Spritzen Sie das GingiTrac-Retraktionsmaterial mit Hilfe der Kanüle direkt um den Zahn in die Präparierungslücke.
5. Füllen Sie die GingiCap mit dem GingiTrac-Retraktionsmaterial und bringen Sie diese auf der Präparierung an.
6. Lassen Sie den Patienten die Zähne kräftig, jedoch ohne übermäßigen Druck zusammenbeißen. Warten Sie, abhängig von der Blutmenge und dem Blutfluss, 3 bis 5 Minuten, bis zur vollständigen Erstarrung und Retraktion.
7. Entfernen Sie das erstarrte GingiTrac. Prüfen Sie die vollständige Retraktion. Wiederholen Sie, falls erforderlich, die Schritte 5 und 6.
8. Spülen Sie, falls erforderlich, den präparierten Zahn ab und trocknen Sie ihn. Sie können jetzt auf normale Weise einen Abdruck erstellen.

- Verwenden Sie GingiTrac™ nicht als endgültigen Abdruck.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Materials keine Latex- oder Gummihandschuhe.

Français

INSTRUCTIONS POUR LA RÉTRACTION GINGIVALE

1. Préparer la dent de la manière habituelle.
2. En cas de saignement excessif, utiliser un agent hémostatique/astringent.
3. Fixer l'embout mélangeur et l'embout distributeur à la seringue de rétraction GingiTrac de 2,5 ml, exprimer une quantité de la taille d'un pois et la jeter, ceci pour s'assurer que le catalyseur et la base sont soigneusement mélangés.
4. Appliquer à la seringue le matériau de rétraction GingiTrac directement autour de la marge de la préparation dentaire à l'aide de l'embout distributeur inclus.
5. Remplir le GingiCap de matériau de rétraction GingiTrac et remettre en place sur la préparation.
6. Demander au patient de refermer la bouche en exerçant une pression ferme mais non excessive. Attendre 3 à 5 minutes pour une rétraction et un durcissement complets, en fonction du saignement ou du suintement.
7. Retirer le GingiTrac durci. Vérifier la rétraction complète. Au besoin, répéter les étapes 5 et 6.
8. Au besoin, rincer et sécher délicatement les dents préparées. Une empreinte standard peut maintenant être réalisée.

- Ne pas utiliser GingiTrac™ comme empreinte finale.
- Ne pas manipuler les matériaux avec des gants en latex ou en caoutchouc.

Español

INSTRUCCIONES PARA LA RETRACCIÓN GINGIVAL

1. Prepare el diente del modo habitual.
2. En caso de hemorragia excesiva, utilice un agente hemostático o astringente.
3. Coloque la boquilla de automezcla y la punta dispensadora sobre la jeringa GingiTrac Retraction de 2,5 ml, extraiga una cantidad ínfima y elimínela. De este modo, se asegurará que el catalizador y la base se han mezclado debidamente.
4. Inyecte el material GingiTrac Retraction directamente alrededor de los márgenes de las preparaciones dentarias, usando la punta dispensadora suministrada.
5. Rellene la cubeta GingiCap con material GingiTrac Retraction y colóquela sobre la preparación.
6. Procure que el paciente mantenga la boca cerrada presionando pero no excesivamente. Dependiendo de la cantidad de sangre o exudado, espere entre tres y cinco minutos para un fraguado y retracción completos.
7. Retire la cubeta GingiTrac. Controle que se haya producido una retracción completa. En caso necesario, repita los pasos 5 y 6.
8. En caso necesario, limpie y seque con cuidado el diente preparado. A continuación, podrá tomar la impresión estándar.

- La cubeta GingiTrac™ no debe usarse a modo de impresión final.
- El material no se deberá manipular con guantes de látex o goma.

Portuguese

INSTRUÇÕES PARA A RETRACÇÃO GINGIVAL

1. Prepare o dente como habitualmente.
2. Em caso de sangramento excessivo, use um agente hemostático/adstringente.
3. Fixe a cânula de mistura e a ponta distribuidora à seringa de 2,5 ml GingiTrac Retraction, prima uma quantidade "do tamanho de uma ervilha" e elimine. Este procedimento destina-se a garantir que o catalisador e a base são cuidadosamente misturados.
4. Injecte o material GingiTrac Retraction directamente em torno da margem das preparações dentárias, utilizando a ponta distribuidora incluída.
5. Encha o GingiCap com material GingiTrac Retraction e coloque novamente sobre a preparação.
6. Diga ao doente para fechar com uma pressão firme, mas não excessiva. Aguardar 3 a 5 minutos, dependendo da quantidade de sangramento ou exsudação, para um endurecimento e retracção completos.
7. Remova o conjunto GingiTrac. Verifique se a retracção ficou completa. Se necessário, repita os passos 5 e 6.
8. Se necessário, enxágue com cuidado e seque o dente preparado. Está agora pronto para fazer a sua impressão normal.

- Não use o GingiTrac™ como impressão final.
- Não manuseie qualquer dos materiais com luvas de látex ou de borracha.

Nederlands

HANDLEIDING VOOR GINGIVALE RETRACTIE

1. Bereid de tand of kies voor zoals gebruikelijk.
2. Gebruik bij overmatig bloeden een hemostatisch of bloedstelpend middel.
3. Bevestig de mengspuit en de spuitmond op de 2,5 ml GingiTrac Retraction spuit. Druk eerst een hoeveelheid materiaal ter grootte van een erwten korrel buiten om zeker te stellen dat de katalysator en het basismateriaal goed zijn gemengd. Verwijder dit materiaal.
4. Breng met de spuit het GingiTrac Retraction materiaal aan op het gebied direct rond de tand of kies die u voorbereidt. Gebruik daarvoor de meegeleverde spuitmond.
5. Vul de GingiCap met GingiTrac Retraction materiaal en plaats hem terug over de voorbereide locatie.
6. Laat de patiënt zijn mond sluiten, stevig maar zonder overmatige druk. Wacht 3 tot 5 minuten (afhankelijk van de mate waarin bloed of wondvocht vrijkomt) totdat het materiaal geheel is uitgehard en de retractie compleet is.
7. Verwijder het uitgeharde GingiTrac materiaal. Controleer of de retractie compleet is. Herhaal stappen 5 en 6 indien nodig.
8. Spoel en droog de voorbereide tand voorzichtig indien nodig. Nu bent u klaar om op de gebruikelijke wijze een afdruk te nemen.

- Gebruik GingiTrac™ niet voor het maken van de uiteindelijke afdruk.
- Gebruik bij het werken met deze materialen geen latex- of rubberhandschoenen.

Dansk

VEJLEDNING TIL GINGIVAL RETRAKTION

1. Klargør tanden som sædvanlig.
2. Hvis det bløder meget, bruges et hæmostatisk/astringerende middel.
3. Påsæt blandingsdysen og dispenseringsspidsen på 2,5 ml GingiTrac Retraction sprøjten, og tryk en "ærtestor" mængde ud og kasser. Dette er for at sikre, at katalysatoren og basen bliver grundigt blandet.
4. Sprøjt GingiTrac Retraction materialet direkte rundt om tandpræparatets margin ved brug af den medfølgende dispenseringspids.
5. Fyld GingiCap med GingiTrac Retraction materialet, og anbring det tilbage over præparatet.
6. Lad patienten lukke munden med et fast, men ikke for kraftigt pres. Vent 3 til 5 minutter for at opnå fuld hærdning og reaktion, afhængigt af blødnings- eller sivningsmængden.
7. Fjern det hærdede GingiTrac. Kontroller for fuld reaktion. Gentag trin 5 og 6 efter behov.
8. Skyl og tør eventuelt de klargjorte tænder. Du er nu klar til at tage dit standardaftryk.

- Brug ikke GingiTrac™ som det endelige aftryk.
- Brug ikke latex- eller gummihandsker, når du håndterer disse materialer.

Svenska

ANVISNINGAR FÖR GINGIVAL RETRAKTION

1. Preparera tanden som vanligt.
2. Använd ett hemostatiskt/astringent medel vid kraftig blödning.
3. Fäst blandingsmunstycket och dispenseringspetsen vid 2,5 ml GingiTrac Retractionssprutan, tryck ut en mängd material stor som en ärtä som du kastar bort. Detta är för att säkerställa att katalysatorn och basen blandas ordentligt.
4. Spruta GingiTrac Retraktionsmaterialet direkt runt tandens preparationsgräns med hjälp av den medföljande dispenseringspetsen.
5. Fyll GingiCap med GingiTrac Retraktionsmaterial och placera åter över preparationen.
6. Låt patienten bita ihop ordentligt men inte för kraftigt. Vänta i 3 till 5 minuter, beroende på hur kraftig blödningen eller vätskningen är, tills materialet stelnat ordentligt och reaktionen har skett.
7. Ta ut det stelnade GingiTrac. Kontrollera att reaktionen är fullständig. Upprepa punkt 5 och 6 om det är nödvändigt.
8. Skölj och torka försiktigt de preparerade tänderna om det är nödvändigt. Nu kan du ta ett normalt avtryck.

- Använd inte GingiTrac™ som slutgiltigt avtryck.
- Hantera inte något av dessa material med handskar av latex eller gummi.

GINGITRAC™ RETRACTION MATERIAL MSDS

SECTION I - Product/ Company Identification

Product Trade Name: GingiTrac™

Part (Item) Number: REF 360070 GingiTrac Singles

Manufacturer: CENTRIX INC

Address: 770 RIVER ROAD, SHELTON, CT 06484

Emergency Telephone Number: Toll-Free (800)235-5862, (203)929-5582

SECTION II - Hazardous Ingredients/Identity Information

Chemical Family: Condensation Silicone

Hazardous Components: Contains silicic acid esters and dibutyltin dilaurate

SECTION III - Hazards Identification

HAZARD CLASSIFICATION: Irritant

SECTION IV - First Aid Measures

Skin: Wash with plenty of water and soap. Ingestion: Consult a physician.

Inhalation: If affected, remove to fresh air.

Eyes: Flush immediately with plenty of water. If irritation persists, see eye doctor.

SECTION V - Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media: Waterspray, foam, powder, carbon dioxide

Unusual fire and explosion hazards: Material can burn generating irritating gases

Specific intervention methods: Appropriate protective equipment must be worn in case of fire

SECTION VI - Accidental Release Measures

Recovery: Contain and absorb spilled material using an appropriate spill absorbent. Collect in a suitable container for disposal. Cleaning/Decontamination: Wipe up any affected area with absorbent material.

Disposal: Dispose of material in accordance with local, state, and federal requirements.

SECTION VII - Handling and Storage

Handling: Does not require specific technical measures. Note that handling with latex or rubber gloves may inhibit set. Use vinyl gloves. Air sensitive material; keep container tightly closed when not in use.

Storage Containers: Store in supplied packaging (keep container tightly closed)

Storage Incompatibilities: Strong oxidizing agents

Storage Other precautions: Store away from heat sources. Temperature will affect set time.

SECTION VIII - Exposure Controls / Personal Protection

Eye protection: Eye protection recommended

Hands protection: Impervious gloves are recommended

Other equipment: None required

SECTION IX - Physical and Chemical Properties

Appearance: Green base/white catalyst

Vapor pressure:< 5 mm Hg @ 25 C Odor: Slight sweet odor

Water solubility: Insoluble in water Boiling point: >150°C Specific gravity:> 1

Flash point: >300°F (material will ash) Volatile part by weight: 30 percent

Italiano

ISTRUZIONI PER LA RETRAZIONE GINGIVALE

1. Preparare il dente seguendo le tecniche convenzionali.
2. In caso di eccessivo sanguinamento applicare un emostatico o astringente.
3. Attaccare l'ugello miscelante e il puntale di erogazione alla siringa per retrazione GingiTrac da 2,5 ml, far uscire una quantità di prodotto (grande come un pisello) ed eliminarla, per assicurare un'accurata miscelazione del catalizzatore e della base.
4. Erogare con la siringa il materiale per retrazione GingiTrac direttamente attorno al margine delle preparazioni dentali utilizzando il puntale di erogazione in dotazione.
5. Riempire il GingiCap con il materiale per retrazione GingiTrac e riposizionare sopra la preparazione.
6. Invitare il paziente a chiudere con una pressione decisa ma non eccessiva. Attendere 3 - 5 minuti, a seconda dell'entità del sanguinamento o dell'essudazione, affinché l'indurimento e la retrazione siano completi.
7. Rimuovere il GingiTrac indurito. Verificare la completa retrazione. Se necessario, ripetere le operazioni 5 e 6.
8. In caso di necessità, risciacquare e asciugare delicatamente i denti preparati. A questo punto è possibile prendere l'impronta standard.

- Non utilizzare il GingiTrac™ come impronta definitiva.
- Non manipolare i materiali con guanti in lattice o gomma.

Finnish

OHJEET IENMUOTTIA VARTEN

1. Valmistele hammas normaalisti.
2. Jos verenvuoto on runsasta, käytä hemostaattista/supistavaa ainetta.
3. Kiinnitä sekoitusruutuun ja annostelukarki 2,5 ml:n GingiTrac -muottiruiskuun, ruiskuta herneen kokoinen määrä ainetta ja hävitä se. Näin varmistetaan katalyytin ja emäksen sekoittuminen hyvin.
4. Ruiskuta GingiTrac -muottimateriaali suoraan hampaan preparaatiomarginaaliin käyttäen varusteisiin kuuluvaa annostelukärkeä.
5. Täytä GingiCap GingiTrac-muottimateriaalilla ja aseta takaisin preparaation päälle.
6. Potilaan tulee purra hampaat yhteen lujasti mutta ei liian voimakkaasti. Odota 3–5 minuuttia riippuen verenvuodosta tai tihkumisesta, kunnes materiaali ja muotti ovat kokonaan kovettuneet.
7. Irrota kovettunut GingiTrac. Tarkista, että muotti on täydellinen. Toista tarvittaessa vaiheet 5 ja 6.
8. Mikäli tarpeen, huuhtelee valmisteltu hammas varovasti ja kuivaa se. Nyt voit tehdä standardin jäljennöksen.

- Älä käytä GingiTrac™ -muottia lopullisena muottina.
- Älä käsittele kumpaakaan materiaalia lateksi- tai kumikäsinellä.

SECTION X - Stability and Reactivity

Stability: Stable

Materials to avoid: No dangerous reactions known

Hazardous decomposition products:

Silicic acid esters may hydrolyze to form 2-methoxyethanol which can pose additional health hazards

SECTION XI - Toxicological Information

Acute toxicity: Non-toxic Eye contact: Eye irritant

SECTION XII - Ecological Information

Environmental fate: No data available Degradability: Non-biodegradable

Ecotoxicity: Impact on aquatic environment: No data available. No affect anticipated.

SECTION XIII - Disposal Considerations

Dispose in accordance with federal, state and local regulations

SECTION XIV - Transport Information

DOT- not regulated

SECTION XV - Regulatory Information

Federal - SARA title III section 313: This product does not contain any substance subject to reporting requirements at or above de minimis quantities. Federal - TSCA: All components are either listed or otherwise comply with requirements

International - DSL (Canada): All ingredients are listed on the Canadian Domestic Substance List (DSL) International - WHMIS (Canada): Not a "controlled product" under the Canadian Workplace

Hazardous Materials Information System- (WHMIS)

SECTION XVI - Other Information

None.

CAUTION: PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

The above information is based on presently available data and to our best knowledge for handling the product under normal conditions. Any use of this product in any way not indicated on this document or using it together with any other process/procedure will be exclusively under the user's responsibility.

CENTRIX INCORPORATED

770 River Road, Shelton, CT 06484 USA

Toll-Free (USA & Canada) (800) 235-5862

Tel (203) 929-5582 Fax (203) 929-6804

www.centrixdental.com



CENTRIX EUROPE

Hauptstrasse. 64 B, 65719 Hofheim, Germany